

いつも守る ちゃんと守る ICボルドー

季節に合わせて使い分けできる！


ICボルドーなら、等量式の66D、倍量式の48Q、3倍量式の412の3つのグレードから選択できます！

時間と手間を節約！

ICボルドーは水に薄めるだけの簡単設計なので、どなたでも楽々お使い頂けます！



◎散布時期





◎登録内容

作物名	グレード	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
こんにゃく	66D	葉枯病	40倍	100～300L/10a	—	制限なし	散布
		腐敗病	40～80倍	100～300L/10a	—	制限なし	散布
	48Q	葉枯病	25～50倍	100～300L/10a	—	制限なし	散布
	412	葉枯病	20～50倍	100～300L/10a	—	制限なし	散布

ICボルドー

は「効果」と「簡便さ」が優れています！


●データで証明された効果



●手作りボルドーとの違い

●手作りボルドー


手作りボルドーは混合の仕方などで品質に偏りが出るため、高品質なボルドー液を得るのは難しい。



手作りボルドーの散布イメージ図
(反応が不完全な場合)

●ICボルドー

ICボルドーは硫酸銅と石灰が完全な反応をしているため、植物への付着性や残効性が高い。



ICボルドーの散布イメージ図